

Abbréviations courantes

A	Largeur de la lentille	K	Kératométrie
acc	Accommodation	K's	Mesures kératométriques
AK	Auto kératométrie	DN	Diamètre nécessaire
DMLA	Dégénérescence maculaire liée à l'âge	PRP	Point de référence principal
aph	Aphakie	NCT	Tonomètre sans contact
RAR	Revêtement anti-reflet	NPL	Sans perception lumineuse (non-perception lumineuse)
B	Hauteur de la lentille	PPA	Punctum proximum d'accommodation
BD	Prisme - base en bas	PPC	Punctum proximum de convergence
BF	Bifocal	AVP	Acuité visuelle de près
BI	Prisme - base interne	O	Centre optique
OBI	Ophthalmoscopie binoculaire indirecte	TCO ou OCT	Tomographie par cohérence optique
BO ou BE	Prisme - base externe	OD	<i>(Oculus dexter)</i> : œil droit
BH	Prisme - base en haut	TNO	Tête du nerf optique
C/D ou E/P	Cup/disc - rapport excavation/papille	OS ou OG	<i>(Oculus sinister)</i> : œil gauche
cc	<i>(cum correctione)</i> : avec correction	OU ou ODG	<i>(Oculi uterque)</i> : œil droit et œil gauche
CLD	Compter les doigts	EP or PD	Écart interpupillaire
LC	Lentille de contact ou cornéenne	PAL	Verres progressifs
Cyl	Cylindre	PERRLA	Pupilles égales, rondes, réactives à la lumière et à l'accommodation
D	Dioptrie	TS	Trou sténopéique
DBL	Plus petite distance entre les verres	Phaco	Phacoémulsification
JJ ou DD	Lentille de contact à usage unique ou jetable à chaque jour (<i>daily disposable</i>)	DR	Décollement de la rétine
FOD	Examen du fond de l'œil avec dilatation de la pupille	CFNR ou RNFL	Couche des fibres nerveuses rétiniennes
APD	Agents pharmaceutiques de diagnostic	Rx	Ordonnance
ED	Effective diameter	sc	<i>(Sine correctione)</i> : sans correction

EM	E Emmétropie	SC	Résistant aux égratignures
E	Ésophorie	SPH	Sphérique (lentille sphérique)
ET	Ésotropie	Subj	Réfraction subjective
PP/PC	Lentille de contact à port prolongé/port continu	Sx(s)	Symptômes
CE	Corps étranger	TF	Trifocal
FDT	Périmètre à doublage de fréquence	Tx	Traitement
MdeT	Maux de tête	AV	Acuité visuelle
MM	Mouvement des mains	DVO	Distance verre-œil (distance horizontale)
HRT	Tomographe rétinien Heidelberg	CV	Champ visuel
Hx ou HdeC	Histoire de cas	X	Exophorie
LIO	Lentille intraoculaire	XT	Exotropie
PIO	Pression intraoculaire	YAG	Capsulotomie au laser YAG

Abréviations pour les médicaments

a.c. <i>(ante cibum)</i>	avant les repas	q.4h	toutes les quatre heures
BID ou b.i.d. <i>(bis in die)</i>	deux fois par jour (ou 2x/j)	g.h.	toutes les heures
gtt. ou gtte. <i>(gutta)</i>	goutte	QID ou q.i.d.	4 fois par jour
HS ou h.s. <i>(hora somni)</i>	au coucher	co. ou comp.	comprimé
i.c. <i>(inter cibum)</i>	entre les repas	TID or t.i.d.	3 fois par jour
PO ou p.o. <i>(per os)</i>	par la bouche (oral)	Ong.	onguent
PRN or p.r.n. <i>(pro se nata)</i>	au besoin		